

THÔNG TIN THUỐC tháng 12/2024
V/v thông tin sử dụng thuốc mới đã trúng thầu
(ScilinTM M30)

Kính gửi: - Các khoa, phòng tại Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu;

Nhằm cung cấp thông tin thuốc kịp thời, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, hợp lý tại trung tâm, tổ được lâm sàng – thông tin thuốc tóm tắt thông tin sử dụng thuốc mới đã trúng thầu và một số thông tin cảnh giác được.

Thông tin Thuốc ScilinTM M30 (30/70) (Insulin người). Dạng bào chế: hỗn dịch tiêm.

- **Nhóm tác dụng dược lý:** Hormon làm hạ glucose huyết, hormon chống đái tháo đường, insulin.

ScilinTM M30 là insulin có thời gian tác dụng trung bình.

- **Dược động học:** thời gian bắt đầu có tác dụng: sau 30 phút, thời gian tác dụng tối đa: 2-8 giờ, thời gian tác dụng kéo dài tới 24 giờ; thời gian bán thải khoảng 4 phút

- **Chỉ định:**

+ Đái tháo đường type I,

+ Đái tháo đường type II khi các thuốc chống đái tháo đường tổng hợp không còn hiệu quả, khi nhiễm toan máu hôn mê đái tháo đường, bị nhiễm khuẩn nặng, phẫu thuật lớn.

+ Cấp cứu tăng đường huyết trong: đái tháo đường nhiễm acid ceton, hôn mê tăng đường huyết, tăng thẩm thấu mà không nhiễm ceton trong máu. Khi truyền tĩnh mạch dung dịch tăng dinh dưỡng ở người dung nạp kém glucose.

+ Bệnh vồng mạc tiến triển do đái tháo đường.

+ Đái tháo đường ở phụ nữ có thai, đái tháo đường trong thời kỳ thai nghén.

- **Chống chỉ định:** Hạ đường huyết, Quá mẫn với insulin hay bất kỳ một thành phần nào của thuốc. Tiêm tĩnh mạch insulin dạng hỗn dịch.

- **Tương tác thuốc:**

+ Các dịch insulin không nên trộn lẫn với insulin động vật và insulin tổng hợp được chế từ các nhà sản xuất khác. Nhiều thuốc hay sử dụng có thể ảnh hưởng đến tác dụng của insulin và hiệu quả điều trị insulin điều trị insulin.

+ Thuốc và các chất tăng tác dụng của insulin: thuốc chẹn beta, chloroquin, chất ức chế ACE, chất ức chế MAO, methyldopa, clonidine, pentamidine, salicylate, steroid đồng hoá, cyclophosphamide, kháng sinh nhóm sulfonamide, tetracyclin, kháng sinh nhóm quinolon và cồn ethyl

+ Các thuốc làm giảm tác dụng của insulin: Diltiazem, dobutamine, estrogen (cả các thuốc viên tránh thai), phenothiazide, phenytoin, hormon giáp trạng,

heparin, calcitonin, corticosteroid, các thuốc chống virus dùng cho người nhiễm HIV, vitamin và thiazid lợi tiểu.

- **Liều dùng:**

+ Người lớn: tiêm dưới da, liều khởi đầu thông thường khoảng 20-40 IU/ngày, tăng dần khoảng 2 IU/ngày, cho tới khi đạt được nồng độ glucose máu mong muốn.

+ Trẻ em: liều khởi đầu tiêm insulin được khuyến dùng ở trẻ em phát hiện sớm bị tăng glucose huyết trung bình và không có ceton niệu là 0,3 đến 0,5 IU/kg/ngày, tiêm dưới da.

- Bảo quản: nhiệt độ 2-8°C. Không làm đông lạnh thuốc, tránh ánh sáng.

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 25°C sau khi mở nắp.

Khi đã sử dụng, 28 ngày sau khi mở nắp ở nhiệt độ không quá 25°C.

Tài liệu tham khảo:

1. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
2. Dược thư quốc gia Việt Nam.

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 12 năm 2004

DUYỆT LÃNH ĐẠO



Dương Thị Xuân Hoàng

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu : Tổ DLS -TTT.

NGƯỜI THÔNG TIN

[Signature]
Huỳnh Nhật Xuân Mai